

# АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ




Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких свиней. Летальный исход – 100%. Специфических средств профилактики нет! Для человека опасности не представляет. Наносит огромный экономический ущерб.

Механизм распространения – основным путем распространения вируса является механический: через транспорт; при кормлении; через инструменты и одежду обслуживающего персонала; грызунами и другими животными; встречающимися на ферме.

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: большие животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются, быстро устают, наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке; слизисто-гнойные выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют; у больших животных покрывается хвост; иногда понос с кровью, чаще запор; слабость и параличи задних конечностей; шаткая походка; повышенная температура тела – до 40,5-42,0 °С; опоясание кожи и слизистых; лимфатические кровозлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления первых клинических признаков.



Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом; трупы свиней, навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы, перемешивая с известью; деревянные помещения, где содержались животные дезинфицируют 3% горячим раствором едкого натра и 2% раствором формальдегида; на расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинополовые убивают, а мясо утилизируют на специализированных предприятиях; карантин снимается через 6 месяцев с последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина; в случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожаются все свинополовые, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III и IV уровней биологической защиты.

Чтобы предотвратить занос африканской чумы необходимо: не допускать

посторонних лиц в свое хозяйство; обеспечить безвзрывное содержание свиней; исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов; покупать корма только промышленного производства и подвергать их тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее 80 °С; проводить обработку помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (кущечей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами; не осуществлять убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убой специалистами государственной ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинации (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами; не выбрасывать турупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не пытаться переработать мясо паавших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях свиней 8(846)951-00-31

## Африканская чума свиней: памятка населению

**АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)** высоко контагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, при которой летальный исход в первичных очагах составляет 100%.

Самая большая опасность этого заболевания состоит в следующем:

1. Отсутствие вакцин и медикаментов, предохраняющих от этой болезни.
2. Все свинополовье хозяйств, куда проникает вирус, погибает.
3. Огромные экономические потери.

На людей вирус не распространяется.

Заболевание сопровождается лихорадкой, параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями и передается не только при контакте здоровых животных с больными, но и распространяется через корм, пастбища, транспорт, в котором перевозят больных животных. Животное погибает через 2-5 дней после заражения, при этом лечение больных животных запрещено.

Оздоровительные мероприятия при АЧС сводятся к следующему:

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населенного пункта или весь населенный пункт, в зависимости от степени заболеваемости, а в сельскохозяйственных организациях – свиноводческий или полностью СТФ, где зарегистрировано заболевание африканской чумой свиней) – уничтожение (бескровный метод умерщвления и сжигание) всех свиней независимо от возраста, веса; признаков заболевания (т.е. заболело животное или нет);

В первой угрожаемой зоне ( в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага) – поголовный убой всех свиней на мясокомбинате, с выработкой варенных, варено-копченых колбас или изготовлением консервов;

В первой угрожаемой зоне запрещается:

продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за его пределы в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий), а также в последующие 6 месяцев – свиней и продукции свиноводства;

Во второй угрожаемой зоне ( в радиусе 100 км вокруг первой угрожаемой зоны) запрещается торговля продукцией свиноводства на рынках, проведение ярмарок и выставок.

Во всех зонах, на всех дорогах, ведущих из неблагополучного пункта, организуют круглосуточные охранно-карантинные посты, оборудованные шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных, которые будут действовать еще в течение 6 месяцев после снятия карантина.

Разведение свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается только через год после снятия карантина!

Государственная ветеринарная служба района просит Вас выполнять ряд необходимых мероприятий с целью предотвращения заноса и распространения на территории Шенталинского района африканской чумы свиней. Для этого необходимо:

### **СОДЕРЖАТЬ:**

имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней в подворьях в огороженных местах, безвыгульно;

использовать отдельную спецодежду и инвентарь по уходу за свиньями и проводить их дезинфекцию после проведенных работ.

### **НЕ ДОПУСКАТЬ:**

свободного выгула свиней из помещений;

контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;

приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства без ветеринарного осмотра.

### **ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:**

для кормления, поения и ухода за свиньями иметь отдельную одежду и обувь;

в случае появления заболевания свиней или внезапной их гибели **НЕМЕДЛЕННО** обратиться в государственную ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельского поселения;

не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины и другие места;

проводить утилизацию в местах, определенных администрацией сельского поселения;

не завозить свиней без разрешения государственной ветеринарной службы.

### **ПОМНИТЕ:**

Выполнение Вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки.

**Ветслужба района (тел. 2-17-90; 2-12-22)**